



# ZOLVIS 80 SECTOR

FUNGICIDA A BASE DI ZOLFO PER IL CONTROLLO DELL'OIDIO, TICCHIALATURA E MONILIOSI IN VITICOLTURA, FRUTTICOLTURA, ORTO-FLORICOLTURA. GRANULI IDRODISPERSIBILI.

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

### VITE:

contro Oidio g 200-400/hl iniziare i trattamenti: molto presto (germogli 5-10 cm), proseguire poi in abbinamento con i prodotti antiperonosporici - (Poltiglia Bordolese Industriale Manica). Nelle situazioni di forte pressione della malattia, per ottenere una più persistente durata d'azione ed un'azione eradicante e curativa, impiegare la dose di g 600-1000/hl.

### POMACEE (MELO, PERO):

contro l'Oidio e ticchialatura del melo g 600/hl nei trattamenti pre-fiorali; g 200-400/hl nei trattamenti post-fiorali. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-12 giorni (adottando l'intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malattia).

### DRUPACEE (PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO) E MANDORLO:

contro Oidio g. 200-600/hl. Su albicocco, pesco e nettari ne usare la dose più alta in pre-fioritura e dopo la raccolta, alla dose di g 200-400/hl dopo la fioritura ripetendo i trattamenti dopo 10-15 giorni (adottando l'intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malattia).

### FRAGOLA:

contro Oidio g 200-500/hl.

### NOCCIOLO:

contro Oidio ed Eriofide g 200-500/hl.

### ORTAGGI:

contro Oidio g 200-500/hl. Intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia e ripetere ad intervalli di 7-15 giorni (adottando l'intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malattia). Pisello g 200/hl, pomodoro g 200-400/hl, melone g 300-350/hl, cocomero, cetriolo, zucca g 200-300/hl.

### BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:

contro Oidio 8 kg/ha dalla comparsa della malattia e proseguire con cadenza di circa 20 giorni.

### CEREALI:

contro Oidio 8 Kg/ha. Trattare alla comparsa della malattia dalla "levata" alla "spigatura".

### FLOREALI ED ORNAMENTALI:

contro Oidio g. 200- 500/hl, intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

## COMPOSIZIONE

ZOLFO puro g. 80  
(esente da Selenio)  
Coformulanti q.b. a g. 100

## FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

## CONFEZIONE



## COLORAZIONE

Non colorato

## CLASSIFICAZIONE

Attenzione: H315

## MISCIBILITÀ

Non è compatibile con antiparassitari alcalini, con oli minerali e captano.

## TEMPO DI CARENZA

5 gg.

## REGISTRAZIONE

N. 13552 del 19.02.2007

