

# Lentagran®

**45 WP**

Erbicida di post-emergenza ad  
azione di contatto



**BELCHIM**  
CROP PROTECTION

## Modalità d'azione HRAC C3

**Lentagran® 45 WP** è un erbicida di contatto a base di Piridate, sostanza attiva appartenente alla famiglia chimica delle fenil-pyridazine. Una volta assorbito interferisce nel processo fotosintetico della pianta, inibendo il trasporto degli elettroni in corrispondenza del Fotosistema II.




**Lentagran® 45 WP** provoca inizialmente un disseccamento del margine fogliare dell'infestante e rapidamente la morte della stessa. I sintomi sono visibili 3-4 giorni dopo l'applicazione.



## Trattamenti consigliati per coltura


Coltura	Dose (kg/ha)	Tempo di carenza
<b>CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO</b>	0,5	21
<b>PORRO</b>	0,5	28
<b>TABACCO</b>	0,5-1	
<b>ERBA MEDICA, TRIFOGLIO</b>	1-1,5	
<b>BROCCOLO, CAVOLETTO DI BRUXELLES, CAVOLI A TESTA, CAVOLO RICCIO, CAVOLO RAPA</b>	0,5-1	42
<b>ERBE FRESCHE</b> (Cerfoglio, Erba cipollina, Foglie di sedano, Salvia, Rosmarino, Timo, Foglie di alloro (lauro), Drangoncello)	0,5	
<b>CARCIOFO</b>	0,5-1	
<b>PISELLO, FAGIOLO</b>	1	45
<b>LENTICCHIA</b>	0,5	
<b>CECE</b>	0,8	
<b>CAVOLFIORI</b>	1	49
<b>PAPAVERO</b>	0,5	70
<b>ASPARAGO</b>	1	-
<b>MAIS DOLCE</b>	1-1,5	-

### Cipolla, Porro, Aglio, Scalogno




Prevedere trattamenti frazionati del prodotto dopo la 2°-3° foglia vera della coltura, alla dose di 0,5 Kg/ha

### Brassicacee



Prevedere trattamenti frazionati del prodotto dopo la 2°-3° foglia vera della coltura, alla dose di 0,5 – 1 Kg/ha

### Asparago, Carciofo




Prevedere trattamenti frazionati del prodotto dopo la 2°-3° foglia vera della coltura, alla dose di 0,5 – 1 Kg/ha

## Tabacco




Prevedere trattamenti frazionati del prodotto dopo la 2°-3° foglia vera della coltura, alla dose di 0,5 – 1 Kg/ha

## Erba medica, Trifoglio



Prevedere trattamenti frazionati del prodotto dopo la 2°-3° foglia vera della coltura, alla dose di 0,5 -1 Kg/ha

## Cece, Lenticchia, Pisello, Fagiolo



Prevedere trattamenti frazionati del prodotto dopo la 2°-3° foglia vera della coltura, alla dose di 0,5 -1 Kg/ha.  
Non superare 0,5 Kg/ha per Lenticchia e 0,8 Kg/ha per Cece.

## Raccomandazioni pratiche

- Applicare in post-emergenza delle infestanti a dosi frazionate nei primi stadi di sviluppo (fino a 3-4 foglie vere)
- Utilizzare 200-600 L acqua/ha
- Si consiglia di trattare a temperature comprese tra i 10°C ed i 25°
- Effettuare saggi preliminari per verificare la selettività su varietà di nuova introduzione

## Preparazione della miscela


1. Riempire per metà la botte con acqua ed azionare l'agitatore
2. Aggiungere Lentagran® 45 WP mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti.
3. Portare al livello desiderato con la restante parte di acqua

Mantenere l'agitatore in funzione per tutta la durata dell'applicazione

# Lentagran®

45 WP

Impiegare ugelli antideriva



## Spettro d'azione



*Solanum nigrum*



*Chenopodium album*



*Amaranthus retroflexus*



*Galinsoga spp.*



*Mercurialis annua*



*Senecio vulgaris*



*Abutilon theophrasti*



*Datura stramonium*



*Anthemis arvensis*



*Bidens tripartita*



*Picris echioides*

# Lentagran®

45 WP

## Il Link che completa il controllo delle infestanti

- Erbicida di contatto a rapida azione
- Efficace su infestanti dicotiledoni
- Impiego a dosaggi flessibili
- Utile strumento di prevenzione e gestione delle resistenze
- Autorizzato su un ampio numero di colture
- Inserito nei Disciplinari di Produzione Integrata

### Profilo del prodotto

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| • Composizione                | Piridate 45%  |
| • Formulazione                | Polvere bagnabile (WP)  |
| • Meccanismo d'azione         | HRAC C3   |
| • Reg. Ministero della Salute | 14431 del 17/01/2012  |
| • Classificazione CLP         | <br>Attenzione |
| • Confezione                  | 1 kg  |

Un prodotto di: Belchim Crop Protection Italia S.p.A. Registrazione del Ministero della Salute N. 14431 del 17/01/2012 Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



**Belchim Crop Protection Italia S.p.A.**

Centro Direzionale Milanofiori | Strada 6 Palazzo N 3 | 20089 Rozzano (MI)  
Tel. 02 33599422 • 02 33576501 • Fax 02 87152284 | [www.belchim.it](http://www.belchim.it)



Per maggiori informazioni  
inquadra il QRCode e  
scarica la nostra APP